



ASSOCIAÇÃO  
DR. MANUEL LUCIANO DA SILVA  
Instituição Cultural sem fins lucrativos e Estatuto de Utilidade Pública

## Úlceras do estômago e do duodeno

### **Sintomas das úlceras do estômago e do duodeno:**

Azia, náusea, vômitos, dores na barriga e por vezes vomitar sangue. Fezes como borras de café.

Dores no estômago duas horas de depois da refeição. Acordar de noite com a dor no estômago.

### **Causas da úlceras do estômago e do duodeno:**

Até 1983 as causas das úlceras do estômago e do duodeno, em todo o mundo eram: tensão nervosa, apreensão, coisas fritas, salgadas, picantes, bebias alcoólicas e fumar.

Muitas operações se fizeram no mundo para se curar as úlceras gástricas e duodenais.

No dia 4 de Junho de 1983, dois gastroenterologistas da Austrália, Dr. Barry Marshal e Dr. Robin Warren, - Royal Perth Hospital - anunciaram, para o mundo que a causa das úlceras estomacais era uma bactéria chamada *Helicobacter Piloni* que era capaz de viver no fundo do tapete do estômago escondida entre os 30 milhões de pelos do estômago que são as glândulas estomacais.

Ninguém, quis acreditar estes médicos australianos da terra dos cangurus...

Mas os médicos australianos disseram ainda mais. Que a bactéria *helicobacter Piloni* não só causava úlceras, mas também que era a causa do cancro do estômago e que era uma doença contagiosa!

Estas afirmações o alertaram os centros médicos mundiais, que começaram a fazer contra provas e verificaram que os médicos australianos estavam certos e ambos vieram a ganhar o Premio Nobel da Medicina em Dezembro de 2005.

### **Testes**

Que testes é que se devem fazer?

Uma gastroenteroscopia por um gastroenterologista.

Vídeo, aspiração de células e líquido do estômago e biopsia ou amostra da ulcera.

### **Tratamento:**

(1) Subsalicilato de Bismuto; (2) Metronidazole; (3) Amoxilina ou Tetraciclina, Eritromicina ou Azitromicina, se o doente é alérgico à penicilina. Este régimen TEM que ser feito durante 14 dias

